



Группа компаний  
**АгроХимПром**

## ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ. ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ И ОЗИМАЯ



Вариант обработки	Вредоносный объект/Назначение	Стадии развития пшеницы											
		До посева	1, 2, 3 лист	Начало кущения	Середина кущения	Конец кущения	Выход в трубку	1-2-е междоузлие	Флаговый лист	Колошение	Цветение	Полная спелость	
Предпосевная обработка	Сплошного действия	<b>ГлифАлт® (2-3 л/га)</b>											
Предпосевная обработка семян	Комплекс болезней	<b>АлтСил® (0,4-0,5 л/т)</b>											
	Стимулирование прорастания семян, ускорение созревания, улучшение качества зерна, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды и заболеваниям	<b>Зеребра® Агро (0,1-0,15 л/т)*</b> или <b>Зеромикс® Альфа (0,1-0,3 л/т)</b> или <b>Бигус (0,4-0,6 л/т)</b>											
Обработка гербицидами	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные		<b>МетАлт® (0,008-0,01 кг/га)</b>		<b>ТриАлт® (0,015-0,025 кг/га)</b>								
	Однолетние и многолетние двудольные сорняки		<b>Эфирам® (0,6-0,9 л/га)</b>										
	Однолетние и многолетние двудольные, включая вьюнок полевой, полынь, молочай лозный		или <b>ТриАлт® (0,01 кг/га) + Эфирам® (0,4-0,6 л/га)</b>		или <b>ТриАлт® (0,01 кг/га) + Татрел®-300 (0,2 л/га)</b>		или <b>МетАлт® (0,005 кг/га) + Эфирам® (0,4-0,6 л/га)</b>						
	Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука		<b>Татрел® – 300 (0,16-0,5 л/га)</b>										
	Однолетние злаковые сорняки		<b>Акбарс (0,4-0,9 л/га)</b>										
Обработка по вегетации	Стимулирование роста, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности		<b>Зеребра® Агро (0,1-0,15 л/га)*</b>		или <b>Зеромикс® Альфа (1,5-3 л/га)**</b>		<b>Бигус (0,2-0,4 л/га)</b>						
			<b>Алтын® (0,15-0,2 л/га)</b>		или <b>АлтАльф® (0,1-0,15 л/га)</b>		или <b>Тайшин® (0,03-0,04 кг/га)</b>						
Обработка инсектицидами	Комплекс вредителей	<b>Альтрум Супер® (0,4-0,5 л/га)</b>											
Обработка фунгицидами	Комплекс болезней	<b>Альтрум Супер® (0,4-0,5 л/га)</b>											
Десикация	Десикация												<b>ГлифАлт® (3 л/га)</b>

\* препарат зарегистрирован в норме расхода 0,1 л/т/га для предпосевной обработки семян и в фазе конец кущения-начало выхода в трубку. Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в норме расхода 0,1-0,15 л/т/га, а также проводить обработки по вегетации в фазе начало кущения-колошение. \*\* Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в фазе начало кущения-колошение.

Данные по рекомендациям отражены в отчетах на сайте zerebra.ru (раздел «отзывы»). Дополнительная обработка по вегетации возможна только после обязательной консультации с агрохимической службой ГК «АгроХимПром».